

### Síndrome de Angelman



El síndrome de Angelman es un trastorno genético. Causa retraso en el desarrollo, problemas de habla y equilibrio, discapacidad intelectual severa y, a veces, convulsiones. Las personas con síndrome de Angelman suelen sonreír y reír frecuentemente, y tienen personalidades felices y excitables (<https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/angelman-syndrome/symptoms-causes/syc-20355621>).

La mayoría de los bebés con síndrome de Angelman no muestran signos o síntomas al nacer. Por lo general, los primeros signos del síndrome de Angelman son retrasos madurativos, como la ausencia de gateo o balbuceo entre los 6 y los 12 meses de edad. Las convulsiones pueden comenzar entre los 2 y 3 años de edad.

Los signos y síntomas del síndrome de Angelman incluyen los siguientes:

- Retrasos en el desarrollo, incluso no gatear ni balbucear a los 6 a 12 meses
- Discapacidad intelectual
- Ausencia de habla o habla mínima
- Dificultad para caminar, moverse o equilibrarse bien
- Sonrisa y risa frecuentes
- Personalidad alegre y con entusiasmo
- Problemas para dormir y para permanecer dormido

La intervención en las personas con síndrome de Angelman se centra en el manejo de los problemas médicos, de sueño y de desarrollo.

### Investigación en Logopedia y Síndrome de Angelman

AELFA-IF, como sociedad científica comprometida con la salud y la calidad de vida de las personas y colectivos, se une a la celebración del Día Mundial sobre Síndrome de Angelman para concienciar a la población general sobre la importancia de esta alteración. Más información en: <https://angelman-asa.org/>

**Para más información, consulta nuestra web y nuestras redes:**



[www.aelfa.org](http://www.aelfa.org)



@aelfaif



@AELFA-IF



Asociación AELFA-IF